

AmisaN

tekuté dusíkaté hnojivo se sírou a bórem

POUŽITÍ PŘI PODZIMNÍM HNOJENÍ ŘEPKY OZIMÉ

Uplatnění nalezeň především tam, kde je požadavek na:

- nižší dávku N (dávka nerealizovatelná pomocí US – do 30 kg N/ha)
- hnojení S na podzim (deficitní stanoviště – lehčí půdy)
- účinnost přes list
- aplikaci v kolejových rádkách širších, než schopnost rozmetadla aplikovat US

Přednosti hnojiva

- N, S, B hnojivo:
 - N - 23 kg/100 l, 80 % ve formě močoviny
 - S - 6 kg/100 l
 - B - 50 g/100 l
- významný účinek přes list
- možnost aplikace nízkých dávek N (od 15 kg/ha – cca 70 l/ha)

Prioritní použití

- **nevyrovnané porosty** od konce září
Malé rostliny potřebují rychlou podporu přes list (především za sucha), ale je potřeba i celkově přihnojit N. S postupující vegetací se snižuje dávka, v případě příznaků barevných změn se upravuje podle jejich intenzity.
- **mírně fialové porosty** v první polovině října
Dávka 100 – 130 l/ha (23 – 30 kg N/ha); vegetace bude ještě dostatečně dlouhá na to, aby se dodaný N využil
- **fialové porosty** koncem října
Dávka 80 - 100 l/ha (18 - 23 kg N/ha); vegetace se blíží ke konci, větší množství dodaného N by se nevyužilo
- **suchá období**
Účinek přes list je jedinou cestou, jak dostat N do rostlin. Pokud zaprší, je efekt ještě vyšší díky účinku přes půdu. Pro účinek přes list **nejsou vhodné děrové trysky**.

U všech aplikací pozor na ranní mrazíky a orosené porosty – možnost pálení.

Nekombinovat s morforegulátory – nevhovuje ani dávka, ani struktura postřiku, u některých razantních (Caramba a Caryx) raději nechat odstup od aplikace 3 – 5 dnů.